

PROPINEB + CYMOXANYL RAINBOW®

Polvo mojable - REGISTRO DE VENTA ICA 1382

COMPOSICIÓN

Ingrediente Activo:

Propineb..... 700 g/Kg
Polymeric zinc 1,2-propylenebis (Dithiocarbamate) de formulación a 20°C.
Cymoxanil..... 60 g/Kg
2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide de formulación a 20°C.

INFORMACIÓN GENERAL

PROPINEB + CYMOXANIL RAINBOW es un fungicida protectante y curativo que tiene una actividad de contacto y sistémico local.

Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos causantes de enfermedades en diversos cultivos. Pertenece al grupo químico de los ditiocarbamatos.

La mezcla de sus ingredientes activos ayuda a inhibir la germinación y eliminar las estructuras de reproducción, interviniendo con la respiración de los hongos, inactivando el sistema de deshidrogenada pirúvica (Propineb). También destruye selectivamente el micelio del hongo, limita la formación de conidias y reduce su poder germinativo (Cymoxanil).

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar de manera preventiva cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición del patógeno. Para lograr una buena eficiencia del producto es necesario repetir la aplicación a los siete días.

PRESENTACIONES

PROPINEB + CYMOXANIL RAINBOW se encuentra en presentación de 500 gramos.

RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Fungicidas



de uso agrícola

MANEJO DE ENVASES

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad física a la dosis recomendada con otros productos. No es recomendable hacer mezclas con sustancias alcalinas. Consulte con un ingeniero agrónomo ante cualquier duda o previo a realizar una mezcla.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantener lejos del alcance de niños y animales. Manipulación del producto: usar mascarilla, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Aplicación del producto: usar respirador con filtro para vapores orgánicos, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Después de cada aplicación y antes de comer, beber, fumar, lavarse las manos, brazos y cara con agua y jabón. Ducharse al terminar la jornada de trabajo.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original.

Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

TELS. EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias toxicológicas (24 horas):

CISPROQUIM:

01-8000-916012 Fuera de Bogotá
2886012 En Bogotá.

DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Cultivo	Blanco Biológico	Dosis	Período de carencia	Período de Reentrada
Papa	Gota (Phytophthora infestans)	1.5 kg/ha	12 días	12 horas



 **agrocentro**[®]
Colombia, S.A.S.

Transversal 55B # 114A-65, Bogotá, Colombia
Teléfonos: 613-6939 y 613-6831
colombia@agrocentro.info
www.colombia.agrocentro.com



Planta de Formulación / Km 9 vía Mamonal, Cartagena – Colombia / Teléfono: 6685966

