

ATOMIK 325 SC[®]

Registro Nacional ICA No. 1538

COMPOSICIÓN

Ingredientes activos:

Azoxystrobin: 200 g/L de formulación comercial a 20 °C (methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy] phenyl]-3-methoxyacrylate)

Flutriafol: 125 g/L de formulación comercial a 20 °C (RS)-2,4'-difluoro-a-(1H-1,2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzhydryl alcohol

Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 L

INFORMACIÓN GENERAL

ATOMIK@325 SC compuesto por Flutriafol del grupo químico de los triazoles, de gran sistemicidad y Azoxystrobin del grupo químico de las estrobirulinas, de origen natural y de amplio espectro de control, exhibe un eficaz comportamiento como preventivo, curativo y erradicante.

Por su actividad preventiva inhibe la germinación de esporas y el desarrollo de estadios tempranos del hongo; las acción curativa afecta los estados post-germinativos de los hongos y erradicante por su efecto antiesporulante al reducir y prevenir los estados reproductivos del hongo y por lo tanto la formación de esporas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

— Arroz: Aplicar a los 45 días después de la germinación o formación de primordio y/o en máximo embuchamiento o inicio de espigamiento dependiendo de la incidencia.

— Aguacate: Se recomienda la aplicación de ATOMIK SC en el segmento preventivo o en presencia de primeros síntomas de la enfermedad con base en los resultados del monitoreo de las enfermedades, de las condiciones ambientales y de acuerdo con la recomendación del asesor técnico.

ATOMIK SC debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas FRAC y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo.

Realizar las aplicaciones dentro de la época de control de la enfermedad. El volumen de agua varía de acuerdo al tamaño del cultivo.



Fungicidas



de uso agrícola

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Todos los equipos de aplicación deben ser calibrados adecuadamente antes del uso, para proveer una cobertura completa y uniforme de las plantas, utilizando la dosis recomendada por el Ingeniero Agrónomo.

El número de aplicaciones depende del grado de incidencia y severidad de la enfermedad. CONSULTE CON EL INGENIERO AGRÓNOMO.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

ATOMIK SC no debe mezclarse con productos plaguicidas, surfactantes o fertilizantes foliares sin antes realizar una prueba de compatibilidad.

ATOMIK® SC no es fitotóxico a las dosis recomendadas en la etiqueta.

EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS Y CULTIVOS SUCESIVOS

ATOMIK® SC no tiene ningún efecto perjudicial sobre cultivos sucesivos ni sobre otros cultivos, sin embargo, para evitar la resistencia que puedan generar los patógenos, se debe tener en cuenta un programa especial de manejo integrado de los cultivos.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ATOMIK 325 SC[®]

Registro Nacional ICA No. 1538

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN —

: PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR (VAPOR O ASPERSIÓN). CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS. EVITAR CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y “no ingiera alimentos, no beba y no fume durante la manipulación y la aplicación”.

Durante aplicaciones terrestres “utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas”, use overol ajustado en el cuello y muñecas, guantes de caucho, botas y gorra lavable para la manipulación del producto. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

Lavarse las manos y la piel expuesta con agua y jabón después de utilizar el producto. Lavar la ropa protectora.

No contamine quebradas, ríos o fuentes de agua, ni prepare el producto cerca de las mismas.

No se debe transportar ni almacenar con productos de consumo humano o pecuario.

ATOMIK® SC debe almacenarse en bodegas especiales lejos de casas de habitación en los envases originales, bien cerrados y en un lugar fresco lejos de alimentos, forrajes, semillas, ropa o animales.

“CONSERVAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL ETIQUETADO Y CERRADO”.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM

BOGOTÁ 2886012 FUERA DE BOGOTÁ 018000916012.



Fungicidas



de uso agrícola

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS —

No han sido determinados síntomas específicos. “En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro de asistencia médica y entregue copia de la etiqueta y la hoja informativa adjunta”.

En caso de intoxicación oral, suministre al paciente grandes cantidades de agua. NO INDUZCA EL VÓMITO. “En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”.

No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE —

— En caso de derrame, aisle el área y aleje el personal no autorizado. Evitar respirar los vapores y el contacto con la piel. Remover las fuentes de ignición si hay combustibles o vapores inflamables presentes y ventilar el área. Absorber con material adecuado, barrerlo completamente y meterlo en un recipiente cubierto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

— Evite contaminar las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano animal, o riego de cultivo.

Respetar las franjas de seguridad mínima de 10 metros para aplicación terrestre distantes de ríos, carreteras, personas, animales y/o cultivos susceptibles de daño por contaminación.

PRESENTACIONES —

ATOMIK 325 SC se encuentra en presentaciones de 250 cc, 1 L, 4 L y 20 L.

ATOMIK 325 SC[®]

Registro Nacional ICA No. 1538



Fungicidas



de uso agrícola

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco).
- Siempre mantenga el producto en su empaque original.
- Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

ADVERTENCIA

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDA DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES EL ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN, LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN. (DECRETO 1443/2004 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL).

Atomik[®] es una Marca Registrada de Agrocentro Colombia S.A.S.


Importado y distribuido

AGROCENTRO COLOMBIA S.A.S.
Calle 108 # 51-81 Barrio Pasadena, Bogotá D.C. Colombia.
Conmutador: (57) 1 6136939

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II MODERADAMENTE PELIGROSO

DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Cultivo	Blanco Biológico	Dosis Lts/ha	P.C.	P.R.
Arroz	Añublo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	0.5 L/ha	28 días	4 horas
Tomate	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	300 cm3/ha	3 días	
Aguaate	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporoides</i>)	0,5 L/ha		



a c agrocentro®
Colombia, S.A.S.

Calle 108 # 51-81, Bogotá, Colombia
Teléfonos: 613-6939 y 613-6831
colombia@agrocentro.info
www.colombia.agrocentro.com

Planta de Formulación / Km 9 vía Mamonal, Cartagena – Colombia / Teléfono: 6685966

