

FIADOR 350 SC[®]

Suspensión Concentrada (SC) - Registro Nacional ICA 2442



COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

IMIDACLOPRID.....350 g/L
1-(6-cloro-3-piridinilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Litro

INFORMACION GENERAL

FIADOR 350 SC, es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, actúa sobre insectos con hábitos alimenticios de chupadores, masticadores y perforadores. Por ser una molécula extremadamente activa, su acción se puede dar con dosis muy bajas, logrando excelentes resultados.

PRESENTACIONES

FIADOR 350 SC se encuentra en presentaciones de 1L, 4L, 20L.

RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda, antes de realizar mezclas, hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala con el producto que se desea mezclar.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- * No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- * No ingerir y evitar el contacto con la piel y los ojos.
- * Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas
- * Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- * Al manipular el producto use ropa de protección overol, guantes de neopreno, gorro, máscara antisalpicaduras irrompibles y máscara especial para herbicidas, botas de caucho
- * Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- * Lavar los equipos de aspersión con agua y un detergente.
- * Causa irritación moderada a los ojos

MANEJO DE ENVASES

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO, DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su envase original. Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

TELS. EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias toxicológicas (24 horas):

CISPROQUIM:

01-8000-916012 Fuera de Bogotá

2886012 En Bogotá

DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

CULTIVO	PLAGA.	DOSIS cc/Ha	*P.R.	*P.C.
POTREROS	Salivazo de los pastos <i>Aeneolamia reducta</i>	250	4 horas	21 días*
TOMATE	Mosca blanca <i>Trialeurodes vaorarium Westwood</i>	600		7 días
ROSAS	Áfidos <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	300		No aplica
ARROZ	Mosca Minadora <i>Hydrellia wirthi Korytkowski</i>	150		7 días



Calle 108# 51-81, Bogotá, Colombia
 Telefonos: 613-6939 y 613-6831
colombia@agrocentro.info
www.colombia.agrocentro.com



Planta de Formulación / Km 9 vía Mamonal, Cartagena – Colombia / Teléfono: 6685966

