

# Golpe certero contra ácaros e insectos plaga



# Amifed<sup>®</sup>

## 200 E.C.



Concentrado Emulsionable

**Amitraz**



Insecticida - acaricida  
de contacto



**FEDEARROZ**  
FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS



### Ingrediente Activo:

#### Amitraz:

- Nombre Químico: N'-(2,4-dimethylphenyl)-N-(((2,4-dimethylphenyl)imino)metil)-N-methyl methanimidamide.
- Concentración: 200 g/L de formulación.
- Grupo Químico: Amidina.

#### Modo de acción:

El modo de acción de AMIFED 200 E.C. involucra probablemente una interacción con los receptores de octopamina en el sistema nervioso de los ácaros, causando un aumento en su actividad nerviosa.

#### Mecanismo de acción:

AMIFED 200 E.C. presenta acción por contacto.

#### Compatibilidad:

AMIFED 200 E.C., se recomienda fumigar un área pequeña para asegurarse de que no hay incompatibilidad, debido a que existen combinaciones o secuencias de aplicaciones de plaguicidas que no han sido ensayadas.

#### Fitotoxicidad:

AMIFED 200 E.C., no presenta fitotoxicidad a las plantas del cultivo si se utiliza siguiendo las instrucciones de uso de la etiqueta.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- AMIFED 200 E.C., es muy tóxico a peces y en general para la vida acuática. No contamine las fuentes de agua con los vapores de aspersión, residuos de aplicación, lavado de envases o lavado de los equipos de aspersión.

- AMIFED 200 E.C., es tóxico para abejas, no aplicar en la época de floración o en horas de actividad de estas.

- Se deben respetar las franjas mínimas de seguridad de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicaciones aérea distantes de los cuerpos de agua, carreteras, troncales, núcleos de población humana y animal o de cualquier otra área que requiera protección.

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES EL ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTVELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN**

### DOSIS DE APLICACIÓN

| CULTIVO                              | PLAGA                                                                                                | DOSIS                     | PC      | PR      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|
| Algodón<br><i>Gossypium hirsutum</i> | Gusano bellotero<br><i>Heliothis spp.</i>                                                            | 1.5 L/ha                  | N.A     | 6 horas |
| Cítricos                             | Acaro tostador<br><i>Phyllocoptruta oleivora</i><br>Acaro Rojo plano<br><i>Brevipalpus phoenicis</i> | 0.75 / 100 litros de agua | 10 días | 6 horas |
| Clavel                               | Acaro<br><i>Tetranychus cinnabarinus</i>                                                             | 1.5 L/ha                  | N.A     | 6 horas |

PC: Periodo de carencia PR: Periodo de reentrada

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III**  
**MEDIANAMENTE TÓXICO - CUIDADO**  
REGISTRO DE VENTA ICA No. 4327  
Titular del Registro: FEDEARROZ



**FEDEARROZ**

FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS  
Tel: 4251150 • Bogotá-Colombia  
www.fedearroz.com.co