

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

**1. Empresa Titular:**

Sumitomo Corporation Colombia S.A.S.

**2. Nombre del Producto:**

**SAPROL DC**

**3. Uso:**

FUNGICIDA

**4. Ingrediente Activo:**

TRIFORINE, 190 g/L

**5. Grupo Químico:**

PIPERAZINA

**6. Usos:**

ROSAS, fríjol, cebada, café...

**7. Categoría Toxicológica:**

II Moderadamente Peligroso

**8. Formulación:**

CONCENTRADO DISPERSABLE DC

**9. Registro de Venta ICA #:**

934

**10. Presentaciones:**

frascos plásticos de 100, 250, 500cc y 1Lt.

**11. Mecanismo de Acción:**

Inhibe la síntesis de ergosterol.

**12. Modo de Acción:**

Fungicida de acción por contacto, translaminar o parcialmente sistémico.

Tras su aplicación por vía foliar, SAPROL actúa en forma preventiva y curativa. Penetra y se transporta hacia distancias cortas. La TRIFORINA es capaz de inhibir la síntesis de ergosterol en los organismos fúngicos sensibles, ocasionando la degradación y ruptura de sus membranas mitocondriales, frenando su respiración.

**13. Apariencia:**

LÍQUIDO ÁMBAR CLARO TRASLÚCIDO.

#### 14. Recomendaciones de Uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIONES	Período de Carencia	Período de Reentrada
Café	Roya ( <i>Hemileia vastatrix</i> )	0.6 L/ha, aplicar 1 vez, con la aparición de las primeras infecciones en el lote.	21 d	12 h
Cebada	Roya Amarilla ( <i>Puccinia triformis</i> ) Oidio - Cenicilla ( <i>Erysiphe graminis</i> )	Tres aplicaciones distribuidas así: <u>Primera:</u> Cuando empiece el embuchamiento. 1 litro por hectárea. <u>Segunda:</u> Cuando haya más del 50% de espigamiento. 1 litro hectárea. <u>Tercera:</u> Cuando se observe el estado de grano lechoso. 1litro hectárea. Use siempre de 400 a 600 litros de agua por hectárea.		
Rosa	Oidio, cenicilla ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	1,25 c.c./litro. Generalmente las aspersiones se realizan cada 7 a 10 días, según la susceptibilidad de las plantas a la enfermedad e intensidad de las infecciones. Use de 1200 a 1500 litros de agua por hectárea.	No aplica	
	Roya ( <i>Phragmidium mucronatum</i> )			
	Mancha negra ( <i>Diplocarpon rosae</i> )			
Frijol	Roya ( <i>Uromyces phaseoli</i> )	1000 cc en 400-600 litros de agua por hectárea. Generalmente las aplicaciones se efectúan a los 25 y 35 días después de la siembra. Sin embargo, en zonas con infecciones intensas, las aplicaciones se deben realizar preferiblemente a los 20, 30, 40 días contados a partir de la fecha de siembra.	10 d	
	Mancha angular ( <i>Isariopsis griseola</i> )			

Venta por prescripción de un Ingeniero Agrónomo. Lea la etiqueta antes de usar el producto. **Plaguicida**. Consulte con su Ingeniero Agrónomo. ®Marca Registrada de Sumitomo Corporation.

Importado y Distribuido por SUMITOMO CORPORATION COLOMBIA.  
Calle 113 # 7-21 oficina 1111. Tel. (57-1) 629 2171. Fax: (57-1) 629 2282. Bogotá, D. C. Colombia.