

DRASTIKO 800WG[®]

Granulos Dispersables en Agua (WG) - Registro Nacional ICA 2265

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Cyproconazole	300 g/K
(2RS,3RS,2RS;2RS,3SR)-2-(4-Chlorophenyl)-3-Cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol.	
Fipronil	200 g/K
5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α -trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfanylpyrazole-3-carbonitrile	
Tiametoxam	300 g/K
3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene(nitro)amine	

Ingredientes Aditivos e Inertes:..... c.s.p 1 K

INFORMACION GENERAL

DRÁSTIKO 800 WG es un insecticida y fungicida, con acción sistémica y de contacto controlando adultos y estados inmaduros del insecto, y de manera preventiva curativa para el caso de hongos.

PRESENTACIONES

DRÁSTIKO 800 WG se encuentra en presentaciones de 100 gr, 500gr y 1 Kg

RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda, antes de realizar mezclas, hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala con el producto que se desea mezclar.



de uso agrícola



de uso agrícola

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- * No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- * No ingerir y evitar el contacto con la piel y los ojos.
- * Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas
- * Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- * Al manipular el producto use ropa de protección overol, guantes de neopreno, gorro, máscara antisalpicaduras irrompibles y máscara especial para herbicidas, botas de caucho
- * Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- * Lavar los equipos de aspersión con agua y un detergente.
- * Causa irritación moderada a los ojos

MANEJO DE ENVASES

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO, DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empresa original. Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

TELS. EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias toxicológicas (24 horas):

CISPROQUIM:

01-8000-916012 Fuera de Bogotá

2886012 En Bogotá

DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	*P.R.	*P.C.
CAFE	Roya (Hemileia vastatrix)	80 gr/Ha	4 horas	15 días
ARROZ	<i>Hydrellia wirthi</i> Korytkowski	70 gr/Ha	4 horas	15 días
	Añublo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i> Kühn)	133 gr/Ha		
ROSAS	<i>Trips, (Frankliniella occidentalis)</i>	200 gr/Ha	4 horas	NA



Calle 108#51-81 , Bogotá, Colombia
 Telefonos: 613-6939 y 613-6831
colombia@agrocentro.info
www.colombia.agrocentro.com



Planta de Formulación / Km 9 vía Mamonal, Cartagena – Colombia / Teléfono: 6685966

